

## CUADRO COMPARATIVO DE ERUPCIONES CUTÁNEAS COMUNES EN LA INFANCIA

	Fiebre	Comezón	Erupción cutánea	Color	Localización	Duración del problema	Otro
Meningitis meningocócica	Sí, fiebre alta.	No	Manchas pequeñas rojas o púrpuras que algunas veces parecen hematomas. <b>Las erupciones son una señal importante de que la persona necesita ver a un médico inmediatamente. ¡Es una emergencia!</b>	Rojo o púrpura	Axilas, ingle, tobillos, zonas donde los elásticos de la ropa ejercen presión (como la ropa interior o los calcetines).	Hasta que se reciba tratamiento .	Dolor de cabeza intenso; rigidez en el cuello, hombros o espalda; náuseas o vómitos; alteraciones del estado mental (irritabilidad, confusión, aletargamiento o estado comatoso).
Hiedra venenosa	No	Intensa	Ampollas	Rojo	Zonas expuestas	7 a 14 días.	Exudación; algo de inflamación.
Eccema	No	Moderada	Ampollas ocasionales al infectarse.	Rojo	Codos, muñecas, rodillas, mejillas.	Hasta que sea controlada.	Humedad, exudación.
Varicela	Sí	Intensa durante la fase de pústula.	Plana, luego elevada, después aparecen ampollas, finalmente costras.	Rojo	Puede comenzar en cualquier parte del cuerpo; más notorio en el tronco y la cara.	4 a 10 días.	Las lesiones evolucionan desde lesiones planas a pequeñas ampollas que se convierten en costras.

Sarampión	Sí	Ninguna a leve.	Plana	Rosado, luego rojo.	Primero en la cara, luego en el pecho y abdomen; luego en los brazos y piernas.	4 a 7 días.	La fiebre antecede a la tos y al enrojecimiento de los ojos.
Eritema infeccioso	Sí	No	Apariencia reticulada en encaje.	Rojo	Primero en la cara, luego en los brazos y piernas, finalmente en el resto del cuerpo.	3 a 7 días	Erupción similar a una "cachetada en la mejilla" que viene y va.
Roséola	Sí	No	Plana, ocasionalmente con algunos abultamientos.	Rojo	Primero en el tronco, luego en los brazos y en el cuello; muy poco en la cara y en las piernas.	1 a 2 días.	Fiebre alta por 3 días que desaparece cuando la erupción aparece.
Fiebre escarlatina	Sí	No	Plana, sensación de papel de arena al tacto.	Rojo	Primero en la cara, luego en los codos; se propaga rápidamente por todo el cuerpo en 24 horas.	5 a 7 días.	Dolor de garganta; descamación de la piel, especialmente en las palmas de las manos.